

ETUDE DE FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES – EQUATIONS/INÉQUATIONS

PARTIE A

On rappelle que la fonction $\sin(x)$ est périodique, de période 2π .


A.1) Sur l'intervalle $[0 ; 2\pi[$, l'équation $\sin(x) = \frac{1}{2}$ admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{\pi}{6} \text{ et } x_2 = \frac{5\pi}{6}.$$

Dans \mathbf{R} , l'ensemble des solutions pour x de l'équation $\sin(x) = \frac{1}{2}$ est :

$$\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right\} \text{ avec } k \in \mathbf{Z}.$$

A.2)



La figure ci-dessus donne la représentation graphique de $\sin(x)$ et de la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$.

Dans l'intervalle de périodicité $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6} + 2\pi \right]$, l'inéquation $\sin(x) < \frac{1}{2}$ est vérifiée

pour $\frac{5\pi}{6} < x < \frac{13\pi}{6}$, ce qui donne sur \mathbf{R} :

$$\frac{5\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{13\pi}{6} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbf{Z}.$$

PARTIE B

Soit f définie par $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$.

B.1) En rappelant que $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$ et que

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ on a :}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} [\sin(x) + \cos(x)] = \frac{\sqrt{2}}{2} f(x).$$

B.2) On déduit de ce qui précède que $f(x) = \frac{2}{\sqrt{2}} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

Résoudre l'équation $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ revient à résoudre $\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, c'est à dire

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}.$$

D'après A.1), l'ensemble des solutions de cette équation pour $x + \frac{\pi}{4}$ dans \mathbf{R} est :

$$\left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right\} \text{ avec } k \in \mathbf{Z}.$$

Ce qui donne pour x :

$$\left\{ -\frac{\pi}{12} + 2k\pi, \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \right\} \text{ avec } k \in \mathbf{Z}.$$

B.3) En raisonnant similairement avec le résultat trouvé en A.2), on résout l'inéquation

$$f(x) < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ dans } \mathbf{R} :$$

$$\frac{7\pi}{12} + 2k\pi < x < \frac{23\pi}{12} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbf{Z}.$$